

# E

pšenice ozimá

# Forhand

## Potravinářská jakost E<sup>2</sup>



Banquet x Ludwig.

Registrace EU.

Odrůda je právně chráněná.

Ranost  
poloraná



Výška rostliny  
vysoká



Odnožovací  
schopnost  
dobrá až  
velmi dobrá



HTZ

45 g

1000 x



Mrazuvzdornost  
výborná



### Potravinářská jakost


kontrolní odrůda **Forhand (2008-10)**

Objemová hmotnost	768	<b>812</b>
Obsah bílkovin	12,7	<b>13,6</b>
Sediment	45	<b>56</b>
Pádové číslo	358	<b>349</b>
Obsah lepku v šrotě	33,3	<b>35,8</b>

Zdroj: ÚKSÚP 2008 – 2010

**Forhand** byl registrován v roce 2011. Odrůda vznikla křížením dvou známých a velmi dobrých odrůd – Banquet a Ludwig. Po těchto rodičích získala vynikající potravinářskou kvalitu, která se dá označit jako super elitní (SE). K dalším přednostem odrůdy patří plasticita k pěstitelským podmínkám a výborná mrazuvzdornost prověřená holomrazy v zimě 2011/12.

### Porovnání výnosů odrůdy Forhand na kontrolní odrůdy (ÚKSÚP 2008–10, %)



NIŽŠÍ INTENZITA	STŘEDNÍ INTENZITA	VYSOKÁ INTENZITA
-----------------	-------------------	------------------

<b>rajonizace</b>	jedná se o velice plastickou odrůdu, jejíž pěstování je možné ve všech výrobních oblastech
-------------------	--

### Setí

<b>předplodina</b>	Ize ji pěstovat po jakékoliv předplodině po obilní předplodině doporučujeme fungicidní ochranu proti chorobám pat stébel
<b>termín</b>	v agrotechnickém termínu pro danou oblast
<b>výsevek</b>	3,5 – 4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek

### Hnojení N (kg/ha)

<b>celkové</b>	110	140	180
<b>regenerační (časně zjara)</b>	40 (N hnojivo s obsahem S 20)	50 (N hnojivo s obsahem S 25)	60 (N hnojivo s obsahem S 30)
<b>1. produkční (BBCH 29-30)</b>	30 – 50	30 – 50	30 – 50
<b>2. produkční (BBCH 32-37)</b>		20 – 30	30 – 50
<b>kvalitativní (BBCH 39-51)</b>	20 – 30	20 – 40	20 – 40

### Regulace růstu

<b>BBCH 25-29</b>		chlormequat-chloride (Stabilan 1 l/ha)	
<b>BBCH 29-31</b>	trinexapac-ethyl (Moddus 0,2 l/ha)	chlormequat-chloride + trinexapac-ethyl (Stabilan 0,5 l/ha + Moddus 0,2 – 0,3 l/ha)	chlormequat-chloride + trinexapac-ethyl (Stabilan 0,5 l/ha + Moddus 0,4 l/ha)
<b>BBCH 32-39</b>		případně ethephon (Cerone 0,5 – 1,0 l/ha)	

### Fungicidní ochrana

<b>T0</b>		po obilnině thiophanate-methyl (Topsin M), carbendazim (Karben Flo)
<b>T1</b>		picoxystrobin + chlorothalonil (Credo, 1,4 l/ha), epoxiconazol + pyraclostrobin (Opera Top)
<b>T2</b>	spiroxamin + tebuconazole + triadimenol (Falcon 460 EC), spiroxamin + prothioconazol + tebuconazol (Hutton), propiconazol + fenpropidin (Archer Turbo)	
<b>T3</b>		tebuconazol + prothioconazol (Prosaro), tebuconazol + prochloraz (Zamir)

Všechny údaje uvedené na tomto letáku mají pouze všeobecný charakter, a proto by měly být doplněny o vlastní znalosti a zkušenosti místních podmínek. V případě pochybností doporučujeme provést malé srovnávací pokusy k odzkoušení místních podmínek, které mohou přispět ke zjištění, jaký vliv mohou mít na uvedenou odrůdu.